

関節リウマチ合併したAAアミロイドーシスの 治療に関する臨床研究

<研究分担者>

吉崎 和幸 (大阪大学)

<共同研究者>

江口 勝美 (長崎大学)

奥田 恭章 (道後温泉病院)

寺井 千尋 (自治医科大学)

中村 正 (熊本整形外科病院)

養田 清次 (自治医科大学)

山田 俊幸 (自治医科大学)

石原 得博 (虎の門病院)

高市 憲明 (大阪大学)

田中 敏郎 (信州大学)

池田 修一 (都立大塚病院)

稲田 進一 (愛知医科大学)

今井 裕一 (東北大学)

工藤 幸司 (高知大学)

公文 義雄 (高知大学)

黒田 毅 (新潟大学)

河野 裕夫 (山口大学)

小関 由美 (東京女子医科大学)

佐伯 修 (堺温心会病院)

田村 裕昭 (勤医協中央病院)

土橋 浩章 (香川大学)

中里 雅光 (宮崎大学)

中野 正明 (新潟大学)

松原 司 (松原メイフラワー病院)

森口 正人 (自治医科大学)

山田 正仁 (金沢大学)

山名 征三 (東広島記念病院)

佐伯 行彦 (大阪南医療センター)

安東 由喜雄 (熊本大学)


<目的> AAアミロイドーシスを合併した関節リウマチ患者に対して、生物学的製剤、特にトシリズマブを用いた治療による効果を病理および生化学的所見を用いて評価する


<試験方法>

患者登録
同意

トシリズマブ群

非トシリズマブ群





Results

(1 year tocilizumab therapy)

- **Decrease and normalization of serum levels of CRP and SAA.**
- **Decrease and or disappearance of proteinuria.**
- **Maintenance of renal function.**
- **Decrease the AA deposition in stomach tissue.**